

殺菌剤

カンタス[®]ドライフロアブル

®=BASF社の登録商標



有効成分
ボスカリド 50.0%

登録番号：第21468号
性 状：褐色水和性微粒
毒 性：普通物*
有効年限：5年
包 装：(100g×10袋)×6箱
667g×20袋
1kg×10袋

*普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

■適用病害と使用方法

(2017年11月30日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ボスカリドを含む農薬の総使用回数	
かんきつ	灰色かび病	1500倍	200~ 700ℓ /10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内	
大粒種ぶどう	灰色かび病 すす点病	1000~ 1500倍		収穫7日前まで				
小麦	眼紋病	1500倍	60~150ℓ /10a	収穫45日前まで	2回以内		2回以内	
いちご	灰色かび病	1000~ 1500倍	100~ 300ℓ /10a	収穫前日まで	3回以内		3回以内	
トマト ミニトマト	灰色かび病 菌核病 葉かび病							
なす	灰色かび病 菌核病 すすかび病							
きゅうり	灰色かび病 菌核病	1500倍		100~ 300ℓ /10a	収穫前日まで		3回以内	3回以内
	褐斑病							
メロン すいか	菌核病							
にんじん	黒葉枯病 斑点病	1000~ 1500倍			100~ 300ℓ /10a	収穫14日前まで	1回	1回
レタス 非結球レタス	灰色かび病 菌核病							
くきちしゃ	灰色かび病 菌核病							

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ボスカリドを含む農薬の総使用回数					
エンダイブ	菌核病	1500倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	1回	散布	1回					
トレビス					2回以内		2回以内					
キャベツ	菌核病 株腐病											
なばな	菌核病	1回		1回								
たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病	1000～1500倍		収穫前日まで	3回以内		4回以内 (定植前は1回以内、 定植後は3回以内)					
	小菌核病											
豆類 (種実、但し、 らっかせい、 あずき、いんげ んまめを除く)	菌核病	1500倍		収穫7日前まで				3回以内	3回以内			
あずき	灰色かび病 菌核病	1000～1500倍		収穫7日前まで				3回以内	3回以内			
	さび病	1500倍										
いんげんまめ	灰色かび病	1000～1500倍								収穫21日前まで	2回以内	2回以内
さやいんげん	菌核病	1500倍								収穫前日まで	3回以内	3回以内
未成熟そらまめ	赤色斑点病	1000倍									2回以内	2回以内
さやえんどう 実えんどう	灰色かび病									1回	1回	
ブロッコリー	菌核病	1500倍								収穫14日前まで	1回	1回
らっきょう	灰色かび病	1000～1500倍								収穫前日まで	3回以内	3回以内
ピーマン	灰色かび病		2回以内			2回以内						
ししとう	黒枯病											
食用ぎく	灰色かび病	1000倍	収穫7日前まで			2回以内				2回以内		