

殺虫剤

コテツ[®]フロアブル



有効成分
クロルフェナピル 10.0%

登録番号：第19184号
性 状：類白色水和性
粘稠懸濁液体
毒 性：医薬用外劇物
有効年限：5年
包 装：(250ml×20本)×2箱
500ml×20本

■適用害虫と使用方法

(2017年11月30日現在)

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	クロルフェナピルを含む農薬の 総使用回数								
りんご	キンモンホソガ ナミハダニ ハマキムシ類 ミノガ類	2000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内								
	ヨモギエダシャク リンゴサビダニ	2000～ 4000倍													
もも	ミカンキイロアザミウマ	2000倍		200～ 700ℓ /10a				収穫7日 前まで	2回以内	散布	2回以内				
	モモハモグリガ カンザワハダニ ナミハダニ モモサビダニ														
ネクタリン	ミカンキイロアザミウマ	2000～ 4000倍						200～ 700ℓ /10a				収穫14日 前まで	2回以内	散布	2回以内
おうとう	ナミハダニ カンザワハダニ チャノキイロアザミウマ	2000倍													
ぶどう	チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ ミカンキイロアザミウマ ブドウサビダニ	2000～ 4000倍	200～ 700ℓ /10a		収穫60日 前まで	2回以内	散布					2回以内			
	ナミハダニ カンザワハダニ ハスモンヨトウ トビイロトラガ モンキクロノメイガ コガネムシ類 ミノガ類	2000倍													

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	クロルフェナピ ルを含む農薬の 総使用回数									
かき	カキクダアザミウマ ナミハダニ カンザワハダニ イラガ類	2000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫14日 前まで	2回以内	散布	2回以内									
	カキノヘタムシガ チャノキイロアザミウマ	2000～ 4000倍														
	カキサビダニ	4000倍														
なし	ナミハダニ カンザワハダニ ニセナシサビダニ	2000～ 3000倍		200～ 700ℓ /10a	収穫前日 まで		3回以内	散布	3回以内							
	ヨモギエダシャク チャノキイロアザミウマ	2000倍														
かんきつ	ヨモギエダシャク	2000～ 4000倍					200～ 700ℓ /10a		収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内				
	アザミウマ類 (ネギアザミウマを除く)	2000～ 6000倍														
	チャノホコリダニ ミカンサビダニ	4000～ 6000倍														
	ハスモンヨトウ リュウキュウミカンサビダニ カネタタキ スグリゾウムシ	4000倍														
いちじく	ヒラズハナアザミウマ カンザワハダニ	2000倍								200～ 700ℓ /10a		収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内	
小粒核果類	オウトウハダニ ウメシロカイガラムシ															
キウイフルーツ	キウイヒメヨコバイ															
マンゴー	チャノキイロアザミウマ															
ゴレンシ	カンザワハダニ															
ブルーベリー	イラガ類															
あずき	ハダニ類 ノメイガ類		2000倍			100～ 300ℓ /10a										収穫前日 まで
豆類(未成熟、 但し、さやいんげ ん、さやえんどう、 実えんどうを除く)	ハダニ類															
さやいんげん	ハダニ類 アズキノメイガ															
実えんどう さやえんどう	ハダニ類 ハスモンヨトウ															
きゅうり	ミカンキイロアザミウマ ミナミキイロアザミウマ ハダニ類 ウリノメイガ ウリハムシ			3回以内	3回以内											

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェニルを含む農薬の総使用回数
うり類 (漬物用)	ミナミキイロアザミウマ ハダニ類	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
すいか	ミナミキイロアザミウマ	4000倍					
	ハダニ類 オオタバコガ ウリノメイガ						
にがうり かぼちゃ (日本かぼちゃ)	ミナミキイロアザミウマ						
トマト ミニトマト	オオタバコガ ミカンキイロアザミウマ ナミハダニ トマトサビダニ						
なす	ミカンキイロアザミウマ ミナミキイロアザミウマ チャノホコリダニ ハダニ類 オオタバコガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ テントウムシダマシ類	2000倍					
	ピーマン とうがらし類 (ししとうを除く)	ミカンキイロアザミウマ ミナミキイロアザミウマ オオタバコガ ハダニ類					
ししとう	ヒラズハナアザミウマ	4000倍					
キャベツ	コナガ アオムシ タマナギンウワバ ハスモンヨトウ ヨトウムシ シロイチモジヨトウ オオタバコガ ハイマダラノメイガ						
	ブロッコリー	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ					
茎ブロッコリー	アオムシ	2000倍					
カリフラワー	コナガ						
メキャベツ 非結球メキャベツ	ハスモンヨトウ						
なばな							
はくさい	コナガ アオムシ ヨトウムシ カブラハバチ						

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数			
非結球 あぶらな科 葉菜類 (こまつな、ひろしま な、チンゲンサイ、さ んとうさいを除く)	コナガ	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫14日 前まで	1回	散布	1回			
チンゲンサイ				収穫7日 前まで						
さんとうさい				収穫3日 前まで						
こまつな	アオムシ コナガ ハクサイダニ			収穫14日 前まで	2回以内		散布、 但し花穂 の発生期 にはマル チフィル ム被覆に より散布 液が直接 花穂に飛 散しない 状態で使 用する	2回以内		
ひろしまな	アオムシ コナガ			収穫14日 前まで						
だいこん	アオムシ コナガ ダイコンサルハムシ			収穫前日 まで	2回以内			散布	2回以内	
かぶ	コナガ ナモグリバエ ヨトウムシ									
みょうが (花穂)	ハダニ類									みょうが (花穂)の収 穫前日まで 但し、花穂 を収穫しな い場合にあ っては開 花期終了まで
みょうが (茎葉)	ハダニ類 ハスモンヨトウ シクラメンホコリダニ ミカンキイロアザミウマ			収穫前日 まで	2回以内				散布	2回以内
いちご				収穫7日 前まで						
ねぎ		収穫前日 まで								
オクラ		収穫前日 まで								
		収穫前日 まで								

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数
レタス	ハスモンヨトウ オオタバコガ ナモグリバエ ヨトウムシ	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
モロヘイヤ	アザミウマ類			収穫7日 前まで	1回		1回
あしたば	ウドノメイガ			収穫前日 まで	2回以内		2回以内
やまのいも	カンザワハダニ ナガイモコガ			収穫3日 前まで			
やまのいも (むかご)							
かんしょ	ハスモンヨトウ ハダニ類	2000～ 4000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内		2回以内
	ヨツモンカメノコハムシ						
はすいも (葉柄)	カンザワハダニ ハスモンヨトウ	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫7日 前まで	2回以内		2回以内
さといも				収穫3日 前まで			
さといも (葉柄)							
アスパラガス	ハダニ類 オオタバコガ ハスモンヨトウ ジュウシホシクビナガハムシ ヨトウムシ	2000倍	100～ 500ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内	2回以内	
ふき	ハスモンヨトウ ハダニ類	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫7日 前まで	2回以内	2回以内	
ふき (ふきのとう)	ハスモンヨトウ ハダニ類			収穫90日 前まで			
てんさい	ヨトウムシ ハダニ類 カメノコハムシ			収穫7日 前まで			
セルリー	ヨトウムシ			収穫14日 前まで			
にんじん	ヨトウムシ キアゲハ ヒョウタンゾウムシ類			収穫前日 まで			
みつば	ハスモンヨトウ	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫14日 前まで 但し、伏せ 込み栽培は 伏せ込み前 まで	1回	1回	
みしまさいこ				収穫21日 前まで	2回以内	2回以内	

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数
エンサイ	ハスモンヨトウ	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内
コリアンダー(葉) やなぎたで				収穫7日前まで			
つるむらさき				2回以内	2回以内		
しゅんぎく							収穫14日前まで
しょうが				収穫前日まで	3回以内		3回以内
葉ごぼう				収穫7日前まで			
すいぜんじな	ハダニ類 ヨトウムシ			収穫前日まで	1回		1回
よもぎ	ミナミキイロアザミウマ			収穫3日前まで			
葉にんにく	ハダニ類			収穫14日前まで	2回以内		2回以内
つわぶき とうき				収穫前日まで			
せんきゅう				収穫90日前まで	3回以内		3回以内
たらのき				親株養成期 但し、 収穫90日前まで			
はまぼうふう(葉)	シクラメンホコリダニ	根株養成期 但し、 収穫75日前まで	2回以内	2回以内			
うど		2葉期まで 但し、 収穫14日前まで			1回	1回	
ほうれんそう	ハウレンソウケナガコナダニ	4000～6000倍	200～700ℓ/10a	収穫7日前まで			2回以内
さんしょう(果実)	チャノキイロアザミウマ	4000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで			
とうもろこし ヤングコーン	ハダニ類 オオタバコガ	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	2回以内	
食用プリムラ	ハスモンヨトウ ヨトウムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ			収穫14日前まで			

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数
食用金魚草 食用なでしこ 食用エキザカム 食用せんいちこう 食用トレニア 食用パンジー	ミカンキイロアザミウマ ヨトウムシ類 ハダニ類	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫14日 前まで	2回以内	散布	2回以内
食用ミニバラ				収穫3日 前まで			
茶	チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ カンザワハダニ チャノナガサビダニ チャノホコリダニ ヨモギエダシク チャノコカクモンハマキ マダラカサハラハムシ チャトゲコナジラミ		200～ 400ℓ /10a	摘採7日 前まで			
食用ぎく	ミカンキイロアザミウマ ミナミキイロアザミウマ ヨトウムシ類 ハダニ類 オオタバコガ アワダチソウグンバイ		100～ 300ℓ /10a	収穫3日 前まで			
きく(葉)				収穫7日 前まで			
きく							
ストック	コナガ アオムシ ヨトウムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ	150～ 300ℓ /10a	発生初期				
花き類・ 観葉植物 (きく、ストック を除く)	ヨトウムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ	150～ 300ℓ /10a	発生初期				
しきみ	クスアナアキゾウムシ	200～ 700ℓ /10a					

作物名	適用場所	適用害虫名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数
みかん	温室、ガラス室等密閉 できる場所	ミカンキイロアザミウマ	300mℓ /10a	10ℓ/ 10a	収穫前日 まで	2回以内	常温煙霧	2回以内
ぶどう		チャノキイロアザミウマ	150mℓ /10a	6ℓ/ 10a	収穫14日 前まで			