

除草剤

ゴゴザン[®] 乳剤

®=BASF社の登録商標



有効成分

ペンディメタリン(PRTR・1種) …… 30.0%

登録番号：第22176号

性 状：暗褐色澄明可
乳化油状液体

毒 性：普通物*

危 険 物：二石・水溶性・Ⅲ

有効年限：5年(500ml、2ℓ)
3年(5ℓ)

包 装：500ml×20本
2ℓ×10本
5ℓ×4本

*普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

■適用雑草と使用方法

(2017年11月30日現在)

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量				
陸稲	一年生雑草	は種後出芽前 (雑草発生前)	全土壌	200~ 400ml /10a	70~ 150ℓ /10a	1回	全面 土壌 散布	北海道 を除く 全域	1回
麦類 (小麦を除く)				300~ 500ml /10a					
小麦		は種後(雑草発生前) ~小麦2葉期(イネ 科雑草1葉期まで)	砂壌土 ~埴土	70~ 100ℓ /10a	雑草 茎葉 散布 又は 全面 土壌 散布				
ソルガム		ソルガム3葉期 (雑草発生前~ 発生始期)		300ml /10a					
とうもろこし 飼料用 とうもろこし		は種後出芽前 (雑草発生前)	全土壌	300~ 400ml /10a	70~ 150ℓ /10a		全面 土壌 散布	全域	
かんしょ		挿苗10日後まで (雑草発生前)		200~ 400ml /10a	100ℓ /10a				
さといも		植付後萌芽前 (雑草発生前)			70~ 100ℓ /10a		全面 土壌 散布		

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量				
ばれいしょ	一年生雑草	植付後萌芽前 (雑草発生前)	全土壌	200～ 300ml /10a	70～ 100ℓ /10a	1回	全面土壌 散布	全域	1回
やまのいも				200～ 400ml /10a	100ℓ /10a				
こんにゃく		植付後又は培土後 (雑草発生前) 但し植付30日後まで	壤土～ 埴土	200～ 300ml /10a	70～ 100ℓ /10a			北海道、 九州を 除く 全域	
はくさい		定植前 (雑草発生前)		200～ 400ml /10a	70～ 150ℓ /10a			全域	
キャベツ カリフラワー レタス 非結球レタス			定植後萌芽前 (根株養成圃) (雑草発生前)						
うど		生育期(根株養成圃) (雑草発生前) 但し収穫60日前まで		200～ 400ml /10a	70～ 100ℓ /10a			北海道	
たまねぎ (直播栽培)		は種後～ 本葉2葉期 (雑草発生前)	300～ 500ml /10a						
たまねぎ (移植栽培)		定植前 (雑草発生前)		200～ 300ml /10a	70～ 100ℓ /10a			全域	
葉たまねぎ		定植後 (雑草発生前) 但し収穫30日前まで	200～ 300ml /10a						
らっきょう		定植前 (雑草発生前)		300～ 500ml /10a	70～ 150ℓ /10a			全面土 散布	
ねぎ		植付後萌芽前 (雑草発生前)	200～ 300ml /10a						
にら		定植後 (雑草発生前) 但し定植10日後まで		300～ 500ml /10a	70～ 100ℓ /10a			畦間土 散布	
にんにく	収穫30日前まで (雑草発生前)	300～ 500ml /10a	70～ 100ℓ /10a			全面土 散布			
	植付前(マルチ前)			壤土～ 埴土	70～ 150ℓ /10a		100ℓ /10a		
	植付後 (雑草発生前) 但し収穫60日前まで								

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数	
				薬量	希釈水量					
葉にんにく (マルチ栽培)	一年生雑草	植付前(マルチ前)	全土壌	400～500ml /10a	70～150ℓ /10a	1回	全面土壌散布	全域	1回	
葉にんにく (マルチ栽培を除く)		植付前		300～400ml /10a	100ℓ /10a					関東以西
らっかせい		は種後出芽前 (雑草発生前)		200～300ml /10a	70～150ℓ /10a					
にんじん		萌芽前 (雑草発生前)		200～400ml /10a						
アスパラガス		春期収穫直後から萌芽前まで (雑草発生前)		400ml /10a						
ふき(春どり露地栽培)		春期ふき収穫直後から萌芽前まで (雑草発生前)		300～500ml /10a	100ℓ /10a					
ふき (ふきのとう)		生育期 (雑草発生前) 但し収穫90日前まで		200～300ml /10a	70～150ℓ /10a			3回以内 (1年間に1回以内)		3回以内 (1年間に1回以内)
とりかぶと (薬用)		収穫60日前まで (雑草発生前)		300ml /10a	100ℓ /10a					
おけら		は種後出芽前 (雑草発生前)		300ml /10a	100ℓ /10a			全域		
みしまさいこ ぼうふう びゃくし		萌芽後(雑草発生前) 但し収穫120日前まで								
せんきゅう		定植後(雑草発生前) 但し収穫120日前まで		200～400ml /10a	70～150ℓ /10a			1回		1回
とうき いんちんこう		植付後萌芽前 (雑草発生前)								
しょうが		定植前(雑草発生前)		300～500ml /10a	100～200ℓ /10a			2回以内		2回以内
食用ぎく		定植後(雑草発生前)								
きく		萌芽前(雑草発生前)								
りんどう		植付後萌芽前 (雑草発生前)		400～500ml /10a	100～200ℓ /10a			2回以内		2回以内
チューリップ		床替後 (雑草発生前)								
すぎ(床替床) ひのき (床替床)	春期発芽前 又は夏切後 (雑草発生前)	300～400ml /10a								
桑										