


殺菌剤

デラン[®]フロアブル

®=BASF社の登録商標



有効成分

ジチアノン(PRTR・1種) 42.0%

登録番号：第21816号

性 状：褐色水和性
粘稠懸濁液体

毒 性：医薬用外劇物

有効年限：3年

包 装：500ml×20本

■適用病害と使用方法

(2017年11月30日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジチアノンを含む農薬の総使用回数			
かんきつ	黒点病	1000~1500倍	200~700ℓ/10a	収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内			
	そうか病 炭疽病(さび果)	1000倍								
りんご	輪紋病	1000~2000倍		収穫60日前まで				3回以内	散布	3回以内
	モニリア病 斑点落葉病 黒星病 炭疽病									
	黒点病 褐斑病									
かき	炭疽病 落葉病 うどんこ病	2000倍		収穫90日前まで				5回以内	散布	5回以内
もも	せん孔細菌病	600~1000倍		収穫7日前まで				4回以内	散布	4回以内
	灰星病 ホモブシス腐敗病	600倍								
	黒星病	600~1000倍								
	縮葉病	1000倍								
ネクタリン	せん孔細菌病	600~1000倍	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内				
	灰星病 ホモブシス腐敗病	600倍								
	黒星病	600~1000倍								
	縮葉病	1000倍								

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジチアノンを含む農薬の総使用回数
うめ	黒星病 すす斑病	2000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫45日前 まで	1回	散布	1回
なし	黒星病 黒斑病 輪紋病 赤星病 疫病 炭疽病 心腐れ症 (胴枯病菌) 黒斑細菌病	1000倍		収穫60日前 まで	4回以内		5回以内
ぶどう	枝膨病 べと病 黒とう病 晩腐病	200倍		落弁期まで 但し、収穫 75日前まで	2回以内		3回以内 (休眠期は 1回以内、 生育期は 2回以内)
	黒とう病 晩腐病 つる割病			休眠期	1回		
いちじく	そうか病	1000倍		収穫75日前 まで	3回以内		3回以内
おうとう	褐色せん孔病			収穫終了後～ 落葉期まで			
いちご	炭疽病		100～ 300ℓ /10a	育苗期	2回以内	2回以内	