



小麦の
眼紋病に
登録拡大!



小麦 眼紋病

倒伏させない!
小麦眼紋病防除に!

殺菌剤


● **カンタス**[®]
ドライフロアブル

- ① 倒伏による減収・品質低下を防ぐ
- ② 他剤耐性菌にも有効

倒伏による減収を防ぐ!

眼紋病は、5月に低温が続く病率90%(発病度で40)以上の条件で倒伏を起こしやすい病害です。発病が激しい場合は、茎の周囲が病斑で取り囲まれて倒伏し、千粒重低下、品質低下も伴い著しい被害となります。特に、小麦の連作により発生のリスクが高まります。

●小麦 眼紋病への効果 (平成21年 北海道立中央農業試験場)



品 種:ホクシン
 は種日:平成20年9月18日
 処理日:平成21年4月20日および5月5日
 病害発生状況:多発生
 調査日:平成21年6月10日(茎の発病度)、7月7日(倒伏面積率%)


■他剤との混用事例

殺虫剤	小麦	殺菌剤	小麦
アドマイヤー顆粒水和剤	●	アミスター20フロアブル	●
エルサン乳剤	◎	イオウフロアブル	●
ゲットアウト顆粒水和剤	●	キンセツ水和剤80	●
サイハロン乳剤	◎	シルバキュアフロアブル	●
スミチオン乳剤	◎	ストロビーフロアブル	●
トレボン乳剤	◎	スポルタック乳剤	◎
バイスロイド乳剤	◎	チルト乳剤25	◎
ペイオフME液剤	●	ユニックス顆粒水和剤47	●

- :混用して問題なかった
- ◎:使用直前の混用なら問題なかった
- :混用で凝集するが、攪拌すれば散布に問題なかった
- △:物理性の点で問題がある
- ×:葉害の点で問題がある

※本表は、あくまでも目安として2例以上の試験事例で問題がなかった場合に●を付しており、品種、生育ステージ、気象条件等により適さない場合がありますので注意してください。

■秋まき小麦の使用時期モデル図



■カンタスドライフロアブルの溶かし方

ここがポイント

タンクに水を張った後、タンクの網を取って、直接タンクにさらさらと振るように入れてください。

タンクの網を取る。 さらさらと振るように入れる。

■適用作物・適用病害と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ボスカリドを含む農薬の総使用回数
小麦	眼紋病	1500倍	60~150ℓ/10a	収穫45日前まで	2回以内	散布	2回以内

●この他に、かんきつ、大粒種ぶどう、いちご、トマト、ミニトマト、なす、きゅうり、メロン、すいか、にんじん、レタス、非結球レタス、きちじや、エンダイブ、トレビス、キャベツ、さやえんどう、たまねぎ、豆類、ブロッコリー、らっきょう、ピーマン、ししとう、なばな、さいいんげん、食用ぎく、あすき、いんげんまめ、実えんどうに登録があります。

△効果・葉害等の注意

- 散布液調製の際は、水をかきまぜながら本剤の所定量を徐々に加えてください。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

△安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

△貯蔵上の注意

- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

このチラシの記載内容は2015年6月現在のものです。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空容器は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。
- 防除日誌を記載しましょう。

BASFジャパン株式会社

〒106-6121 東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー21階
 ☎0120-014-660 ☎03-3796-9419 <http://www.agriculture.japan.basf.com>